

Grammatica (versie 10/02/14)

Legenda: De letters σ en τ worden gebruikt om willekeurige types aan te geven. De letter ρ wordt specifiek gebruikt om \mathbb{Z} of \mathbb{R} aan te geven.

formule ^{$\mathbb{B}|\tau$} genereert formules van type \mathbb{B} , en via een tweede alternatief (meer) formules van type τ .

<i>sectie</i>	<i>naamgeving sectie</i> <i>naamgeving</i>	
<i>naamgeving</i>	Variable <i>naam</i> ^{τ} : <i>type</i> ^{τ} .	<i>een punt ter afsluiting</i>
	Definition <i>naam</i> ^{τ} <i>abstractie</i> ^{τ} .	
	Theorem <i>naam</i> ^{\mathbb{B}} : <i>formule</i> ^{\mathbb{B}} .	
	Variable <i>neerslag</i> : R.	
	Variable <i>Mens</i> : Set.	<i>maakt een nieuw type 'Mens'</i>
	Variable <i>BSN</i> : $\text{Mens} \rightarrow Z$.	
	Definition $P(m : Z) := \neg(\exists p : Z, 1 < p \wedge p < m \wedge (\exists q : Z, m = p \times q))$.	
<i>abstractie</i> ^{$\tau \sigma \rightarrow \tau$}	<i>parameter</i> ^{σ} <i>abstractie</i> ^{τ}	
<i>parameter</i> ^{τ}	(<i>naam</i> ^{τ} : <i>type</i> ^{τ})	
<hr/>		
<i>formule</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	<i>kwantor naam</i> ^{σ} : <i>type</i> ^{σ} , <i>formule</i> ^{\mathbb{B}} <i>equivalentie</i> ^{τ}	
	$\forall m : Z, P m \rightarrow (\exists n : Z, P n \wedge m < n)$	
		<i>een komma in plaats van de gebruikelijke punt</i>
<i>equivalentie</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	<i>equivalentie</i> ^{\mathbb{B}} \leftrightarrow <i>implicatie</i> ^{\mathbb{B}} <i>implicatie</i> ^{τ}	
	$x \wedge y \leftrightarrow \neg x \wedge \neg y$	
<i>implicatie</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	<i>disjunctie</i> ^{\mathbb{B}} \rightarrow <i>implicatie</i> ^{\mathbb{B}} <i>disjunctie</i> ^{τ}	
	$a \rightarrow b \rightarrow a$	
<i>disjunctie</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	<i>conjunctie</i> ^{\mathbb{B}} \vee <i>disjunctie</i> ^{\mathbb{B}} <i>conjunctie</i> ^{τ}	
<i>conjunctie</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	<i>negatie</i> ^{\mathbb{B}} \wedge <i>conjunctie</i> ^{\mathbb{B}} <i>negatie</i> ^{τ}	
	$p \wedge \neg q \vee \neg p \wedge q$	
<i>negatie</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	\neg <i>negatie</i> ^{\mathbb{B}} <i>vergelijking</i> ^{τ}	
	$\neg(\forall n : Z, P n \rightarrow P(n+2))$	
<hr/>		
<i>vergelijking</i> ^{$\mathbb{B} \tau$}	<i>som</i> ^{τ} <i>gelijkongelijk som</i> ^{τ} <i>som</i> ^{ρ} <i>kleinergelijkgroter som</i> ^{ρ}	
	<i>som</i> ^{ρ} \in <i>interval</i> ^{$\mathcal{P}(\rho)$} <i>som</i> ^{τ} <i>met</i> $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$	
	$a \times (x + 2) + b \times x + c = 0$	
<i>interval</i> ^{$\mathcal{P}(\rho)$}	[<i>som</i> ^{ρ} , <i>som</i> ^{ρ}] [<i>som</i> ^{ρ} , <i>som</i> ^{ρ})	
	(<i>som</i> ^{ρ} , <i>som</i> ^{ρ}] (<i>som</i> ^{ρ} , <i>som</i> ^{ρ})	<i>met</i> $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$
<i>som</i> ^{$\rho \tau$}	<i>som</i> ^{ρ} <i>plusminus product</i> ^{ρ} <i>product</i> ^{τ}	<i>met</i> $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$
<i>product</i> ^{$\rho \tau$}	<i>product</i> ^{ρ} <i>maaldoor negatief</i> ^{ρ} <i>negatief</i> ^{τ}	<i>met</i> $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$
	$(p + q) \times (p - q)$	
<i>negatief</i> ^{$\rho \tau$}	$-$ <i>negatief</i> ^{ρ} <i>macht</i> ^{τ}	<i>met</i> $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$
	-5	
<i>macht</i> ^{$\rho \tau$}	<i>term</i> ^{ρ} \wedge <i>macht</i> ^{\mathbb{N}} <i>term</i> ^{τ}	<i>met</i> $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$
	$2 \wedge 2 \wedge k$	
<hr/>		
<i>term</i> ^{τ}	<i>term</i> ^{$\sigma \rightarrow \tau$} <i>waarde</i> ^{σ} <i>waarde</i> ^{τ}	
	max 3 m Verkeerslicht linksaf groen (nu+5)	
<i>waarde</i> ^{$\rho \tau$}	<i>constante</i> ^{ρ} <i>naam</i> ^{τ} (<i>formule</i> ^{τ})	

$type^{\sigma \rightarrow \tau \tau}$	$basistype^{\sigma} \rightarrow type^{\tau}$		$basistype^{\tau}$
	$Z \rightarrow (Z \rightarrow Z) \rightarrow B$		
$basistype^{\mathbb{B} \mathbb{Z} \mathbb{R} naam \tau}$	B		Z R naam ^{Set} (type ^{τ})
	Mens		(Mens \rightarrow Z)
$constante^{\rho}$	0 ... 9		$constante^{\rho}$ 0 ... 9 met $\rho \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$
$naam^{\tau}$	eersteteken		eersteteken etcetera
	$melk2S_L_A_G_R_O_O_M$		
etcetera	overigteken		overigteken etcetera
eersteteken	a ... z		A ... Z -
overigteken	a ... z		A ... Z 0 ... 9 - '
kwantor	\forall		\exists
gelijkongelijk	=		\neq
kleinergelijkgroter	<		\leq > \geq
plusminus	+		-
maaldoor	\times		/